

# CURA CON TERAPIA DE VACIO EN TRASPLANTE HEPÁTICO

Biencinto Burgos Laura; Del Ama Zayas Raquel; Aragón Serrano Adela;; García Santos M<sup>a</sup> Josefa; García Langa Rosa; Losilla Fernández, Blanca; Málaga Bernal M<sup>a</sup> Teresa; Plaza Fernández Laura; Redondo Álvarez Ana Isabel; Ruiz Pizarro Eva;

## INDICACIONES

Síndrome compartimental sin cierre primario en:

- Desproporción entre el tamaño del injerto y la cavidad abdominal.
- Pérdida de la pared abdominal por cirugías previas o politraumatismos.
- A la retirada de una malla tipo Goretex<sup>®</sup>



## PROTOCOLO DE ACTUACIÓN



Técnica estéril



Protección con gasas vaselinizadas



Ajustar esponja a bordes de la herida



Asegurar vacío con apósitos adhesivos



Colocar sistema de aspiración



Cura c/48h-72h

## EVOLUCIÓN



26-01-2009



1 MES



2 MESES



3 MESES



11 MESES

## CONCLUSIONES:

- Favorecer el crecimiento de tejido de granulación.
  - Evitar complicaciones infecciosas.
  - Reducir el tiempo de hospitalización.
  - Reducir los requerimientos analgésicos.
- Favorecer la movilidad y autonomía del paciente.