Hospital Universitario Rey Juan Carlos

SaludMadrid — Comunidad de Madrid

V.A.C

SEEIUC — Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias

SANTIUSTE GARCÍA MIGUEL. BENITO MARTÍN PABLO.

OBJETIVO

Demostrar la eficacia de la terapia por presión negativa, V.A.C (Vacum Assisted Closure) en la resolución de una herida post-Qx. Abdominal abierta, infectada y de tórpida evolución.

CASO CLÍNICO.

Objeto estudio. Varón, 74 años.

A.P: HTA, DSLP, IAM (95/09)

Enfermedad actual: Tumor vesical T1G2 , adenocarcinoma ductal prostático y carcinoma papilar urotelial.

Motivo ingreso:

Cx. Programada (19/03/13) Cistoprostactectomia radical, linfadenectomia y neo vejiga según esquema Bricker.

Ingreso UCI.
(27/03-29/05)

- ✓Dehiscencia de sutura
- ✓Peritonitis fecaloidea
- ✓Shock séptico
- ✓Fracaso multiorgánico.

METODOLOGÍA

Inicio de la Terapia VAC y elaboración de un PLAN DE CUIDADOS, para la evaluación de la herida, durante los 82 días de ingreso hospitalario.

DIAGNÓSTICO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN
Deterioro de la integridad tisular	Recuperar la integridad de los tejidos	Instauración de la terapia VAC y realización de cura según procedimiento
Riesgo de infección.	Evitar infección.	Garantizar medidas de asepsia Valoración del estado nutricional Evaluación continua de signos y síntomas

TERAPIA VAC → ¿QUÉ ES?

Consiste en una técnica, que aplica presión negativa en el lecho de la herida, lo que absorbe el exudado y el líquido extracelular. Esto reduce el edema y la hipoxia tisular, aumentando el flujo de oxigeno y el aporte de nutrientes, minimizando de esta manera el crecimiento de microorganismos.

MATERIALES

- •Bomba de vacio.
- •Sistemas/líneas de presión.
- •Receptal/Depósito.
- •Esponja. Poliuretano y/o polivinilo
- •Apósito adhesivo transparente.

MANEJO CUIDADOS

- •Cambio / Cura c/ 48-72h.
- •Límite de presión (-125 mmHg.)
- •Volumen receptal (350 cc).
- •Acodamientos/ fugas.

La unificación de criterios , la formación y el cumplimiento de un protocolo nos permitirá prestar unos cuidados de calidad en el uso de la terapia VAC.

CONCLUSIÓN → Evaluación / Valoración plan de Cuidados