50 CONGRESO NACIONAL
ENFERMERÍA EN CIRUGÍA

Maridaje de
Experiencias y Evidencia

27-28-29
Mayo 2015
Valladolid

seecir
sociedad española
de enfermería en cirugía

QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL HIPERTÉRMICA Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy(HIPEC) CUIDADOS DE ENFERMERIA EN QUIROFANO

**ANA ISABEL LAGUNA SANZ
ELENA MATEO RESINO
BEATRIZ BARRAGAN ALVARO
MARIA JESUS ALDEA GARCIA
EVA MARIA BURGOS JIMENEZ
LUIS BARBER CASTAÑO**

Hospital Universitario
de Fuenlabrada

Comunidad de Madrid

Introducción

- La **Carcinomatosis Peritoneal** se define como la diseminación tumoral que afecta de forma localizada o masiva, a la serosa del peritoneo y a los órganos de la cavidad abdominal
- Origen:
 - El propio **peritoneo** (Pseudomixoma, Mesotelioma)
 - Tumores **digestivos** (Colorrectal, Gástrico)
 - Tumores **ginecológicos** (Ovario)

Carcinomatosis Peritoneal

- Clásicamente se ha considerado un **estadio terminal** de la enfermedad
- **Tratamiento paliativo**
- La **quimioterapia intravenosa** es muy poco efectiva debido a que difunde muy mal de sangre a cavidad peritoneal y apenas llega
- Supervivencias menores de 6 meses

- Sin embargo, diversos estudios llevados a cabo desde los años 80 sugieren que la carcinomatosis peritoneal debe plantearse como un **estadio locorregional** y que una siembra peritoneal limitada puede ser curada
- Supervivencias mayores al 70% a los 5 años en algunas de estas patologías con una excelente calidad de vida

Carcinomatosis peritoneal

En 1995, el Dr. Paul Sugarbaker del Washington Cancer Institute describió una línea de tratamiento multidisciplinar para los pacientes con CP basada en su filosofía de que “al paciente lo mata lo que el cirujano no ve”, de modo que considera que el tratamiento ideal para estos pacientes se apoya en 3 pilares:

1. Cirugía citorreductora radical oncológica

2. Quimioterapia locorregional según patología

3. Hipertermia $> 42^{\circ}\text{C}$

“La diseminación peritoneal exclusiva de algunos tumores abdominales debe entenderse como una extensión regional y no como una diseminación sistémica: EL PERITONEO ACTUA COMO BARRERA DE CONTENCIÓN”

Paul H Sugarbaker

1. Citorreducción completa

Una cirugía radical o **citorreducción**, muy agresiva y basada en procedimientos por él descritos como **peritonectomías** y varias resecciones viscerales; así, se pretende eliminar toda la carga tumoral visible por el ojo del cirujano

Se trata de procedimientos largos, laboriosos y técnicamente exigentes que sólo pueden llevarse a cabo en centros con equipos quirúrgicos entrenados y experimentados

2. Quimioterápicos locorreional

- La barrera plasmática peritoneal permite que podamos utilizar **concentraciones mayores de quimioterápico** que en la vía sistémica sin los efectos secundarios de ésta
- Deben usarse fármacos con **alto peso molecular**, de absorción lenta y eliminación rápida
- Se prefieren fármacos no dependientes del ciclo celular
- Deben tener **sinergia con la hipertermia**

	Intraperitoneal	Intravenoso	Duración	Solución
Ca Colon	Oxaliplatino	5 - Fluorouracilo Ac. folinico	30 min	Glucosa 5%
Ca Ovario	Paclitaxel		60 min	Peritofundina
Ca Gástrico	Cisplatino Doxorrubicina		90 min	Peritofundina
Pseudomixomas	Mitomicina fraccionada (50% - 25% - 25%)		90 min (0 - 30 - 60)	Peritofundina

Hipertermia (41 - 42°C)

- Tiene efecto de lisis sobre las células tumorales
- Aumenta la penetración del quimioterápico en los tejidos
- Aumenta la citotoxicidad de determinados quimioterápicos

Distribución del quimioterápico
Homogeneidad de la temperatura

HIPEC

Técnica abierta (*Coliseum de Sugarbaker*)

- ❑ Ventajas: Mejor distribución del fármaco y más homogeneidad de temperatura por la cavidad
- ❑ Desventajas: Mayor riesgo de exposición a citostáticos del personal y mayor pérdida de calor

Técnica cerrada (*Fujimoto y Koga*)

- ❑ Ventajas: exposición peritoneal. No pérdida de calor ni citostático.
- ❑ Desventajas: distribución incierta

Inicio: Mayo 2004
POBLACION : 200.000
Nº PROFESIONALES : 1400
Camas : 275
Especialidades : 12
Nº Intervenciones Qx : 13.000

Hospital Universitario de Fuenlabrada

Carcinomatosis peritoneal

Intervenciones / año

Unidad de Carcinomatosis peritoneal

Recursos humanos

COMITÉ DE TUMORES

Cirujanos, Oncólogos, Medicina Nuclear, Radiólogos, Patólogos

QUIROFANO

3 Cirujanos
1 Anestesiólogo
3 Enfermeras
1 Auxiliar
1 Celador

HOSPITAL

Unidad de hospitalización
Anatomía Patológica (Banco Tumores)
Banco de Sangre (hemoderivados)
Laboratorio (analíticas)
Farmacia (quimioterapia)
Servicio Técnico (condiciones ambientales)
UCI, Reanimación
Personal de limpieza

Servicio de prevención de riesgos laborales

Protocolo HIPEC

ACTUALIZACIONES

FECHA	VERSION	NATURALEZA DEL CAMBIO	PAGINAS
08/06/2006	01	Quimioterapia intraoperatoria y prevención de riesgos laborales	TODAS
05/03/2013	02	Cambios introducidos en la técnica de Quimioterapia Intraoperatoria Hipertérmica (HIPEC) y en los posteriores cuidados del paciente	TODAS
18/06/2013	03	Utilización de Equipos de protección individual en UCI y REA provisional durante el periodo de investigación	TODAS
17/02/2015	04	Revisión realizada en respuesta al requerimiento de la ITSS 28/0012963/14	TODAS

Preparación quirófano

Aparataje / Anestesia / Cirugía / Coliseo + HIPEC
Medidas de protección / Gestión de residuos

Almacén HIPEC

Recepción del paciente en quirófano

Informe de seguridad quirúrgica (checklist)

Monitorización

1.- ¿Equipo quirúrgico presente?		☒ SI
2.- ¿Cómo se llama usted?		☒
3.- ¿De dónde le van a intervenir?	CARCINOMATOSIS APENDICULAR	☒
4.- ¿Le han explicado qué le van a hacer?	QUIO	☒
5.- ¿Ha cumplido las horas de ayuno indicadas?		☒
6.- ¿Se ha quitado la dentadura móvil/postiza, los audifonos, las lentillas...?	Retirada de prótesis:	☒
7.- ¿Tiene pruebas de sangre cruzada?	Si, 4 concentrados	☒ SI ☐ NO ☐ N/P
8.- ¿Trae vía venosa permeable?	Vía subclavia	☒
9.- ¿Es usted alérgico a ...?	Sin alertas conocidas.	☒

Monitorización Profundidad Anestésica (BIS)

Inducción Anestésica - Intubación

Protección ocular

Prevención de Trombosis Venosa Profunda

Medias de compresión elásticas y neumáticas

VP nº 16 MSD + calentador de fluidos

Vía Central: Subclavia o Yugular + PVC

Arteria Radial Dcha + Vigileo®

Sonda de temperatura esofágica

Monitorización completa

Opcional: colocar catéter ureteral

Prevención de pérdidas de calor

Manta térmica eléctrica + colchón de gel

Manta de aire caliente (inferior y superior)

Posición paciente

Cobertura quirúrgica

**Equipo universal MEDLINE
REF: DYJPEUNPSM₃**

Incisión xifopubiana

Preparación cavidad abdominal

Separador omnitract®

Valoración de la extensión tumoral

Peritoneal Cancer Index

Regions

- 0 Central
- 1 Right Upper
- 2 Epigastrium
- 3 Left Upper
- 4 Left Flank
- 5 Left Lower
- 6 Pelvis
- 7 Right Lower
- 8 Right Flank
- 9 Upper Jejunum
- 10 Lower Jejunum
- 11 Upper Ileum
- 12 Lower Ileum

Lesion Size

Lesion Size Score

- LS 0 No tumor seen
- LS 1 Tumor up to 0.5 cm
- LS 2 Tumor up to 5.0 cm
- LS 3 Tumor > 5.0 cm or confluence

PCI

Resecciones viscerales

RESECCIONES VISCERALES

Gastrectomías

Apendicectomías

Resección segmentaria colon

Recto

Resección parcial intestino delgado

Colecistectomía

Esplenectomía

Histerectomía con doble anexectomía

Peritonectomías

LOCALIZACIÓN

Peritonectomías diafragmáticas

Peritonectomías pélvicas

Omentectomías de omento mayor

Omentectomías de omento menor

Peritonectomías de flancos

Fulguración de implantes

Exéresis de implantes nodulares

Resección Glisson

Anatomía patológica

**INTRAOPERATORIAS
BANCO DE TUMORES
POSTOPERATORIAS**

ANATOMÍA PATOLÓGICA	
Paciente: _____	FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2014
NOMBRE DE LA PIEZA	
1	Cirugía trocar epigástrico
2	Cirugía laparotomía infra-umbilical
3	XIFOIDE
4	TUMORACION ANEXIAL DCHA (INTRA)
5	Implante Peritoneo parietal fosa ilíaca derecha
6	Ligamento redondo
7	Apendice (intra)
-8	Epiplon menor
9	EPÍPLOO MAYOR
10	PERITONEO DIAFRAGMA DCHO
11	PERITONEOTOMIA MORRISON
12	Lesión raíz de mesentérico
13	LESION PERITONEAL PARIED IZDA PELVIS
14	Hemicolectomía Derecha
✓15	Moco
16	ANEJO IZDO
17	LINFADENECTOMIA PELVICA IZDA (INTRA)
18	Linfadenectomía Pelvica Derecha (INTRA)
19	UTERO
20	LINFADENECTOMIA PARAORTICA
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	

Analítica completa

**HEMOGRAMA
COAGULACION
BIOQUIMICA
GASOMETRIA ARTERIAL
(jeringa verde)**

Petición a Farmacia de la Quimioterapia

HOSPITAL DE FUENLABRADA		Informe de Previsión de Administraciones					Jueves, 13 de Noviembre de 2.014	
Paciente: Programa: QT INTRAPERITONEAL HIPERtermIA		Unidad: Servicio: DIAGNÓSTICO POR IMAG Puesto: TRATAMIENTOS PICO-CNK		Peso: 66,5 Kg S.C.: 1,778 m ²		Edad: 47 años Estatura: 1,71 m		
Protocolo: OXALIPLATINO HIPEC		Fecha: 14/11/2014						
Tipo	Producto	Dosis	Vía	Tiempo	Ciclos	Administrado		
VALIDADO	FOLINICO (203,5 ml/hora - 67,8 gotas/min) ----- SODIO CLORURO 100 ML FOLINATO CALCICO 36 MG Poner 30 minutos antes de la HIPEC Observaciones:	1 Uds.	INTRAVENOSA	0:30:00	Ciclo:1 Día:1			
VALIDADO	FLUOROURACILO (228,4 ml/hora - 76,1 gotas/min) ----- SODIO CLORURO 100 ML FLUOROURACILO 711 MG Poner 30 minutos antes de la HIPEC Observaciones:	1 Uds.	INTRAVENOSA	0:30:00	Ciclo:1 Día:1			
VALIDADO	OXALIPLATINO (216 ml/hora - 72 gotas/min) ----- OXALIPLATINO 540 MG Observaciones:	1 Uds.	INTRAPERITONEAL	0:30:00	Ciclo:1 Día:1			
Texto Asociado								
Solución: Glucosado 5% Volumen: 3 litros Tiempo: 30 minutos								

Quimioterapia intravenosa

5 - FLUOROURACILO

Maquina HIPEC

**BOMBA DE INFUSION
CALENTADOR**

SUCCION

Montaje maquina HIPEC

GLUCOSA 5%

SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL

Control ambiental: llamar a mantenimiento

CONDICIONES NORMALES

- Renovaciones de aire: 15 veces / hora
- Temperatura: 21° - 23°
- Humedad relativa: 40 %
- Velocidad del aire: 0,2 – 0,3 m/s

CONDICIONES HIPEC

- Renovaciones de aire: 20 veces/hora
- Temperatura: 19° - 20°
- Mantener presión positiva (puertas cerradas)

Suspender medidas de calor

Técnica abierta (*Coliseum de Sugarbaker*)

Separador omnitract®

Brazo articulado

Campo de cesárea

Bolsa de nutrición parenteral

Sutura pared abdominal

Coliseo

Sondas de Aspiración y Temperatura

4 salidas: superior, inferior, derecha, izquierda

Sonda rectal $\varnothing$ 22

1-2 Entradas

Sistema en Y

Colocar tubuladuras + aspirador humos

Aspirador de humos

El filtro tiene una eficacia del 99% para partículas de 0,1 micras. El diámetro del tubo es de 22 mm, el caudal de aspiración es de 1257 litros/minuto. El filtro tiene una vida de 6 horas pero se tira al final de cada HIPEC

Sistema de absorción de vertidos (BOA)

Llenar cavidad abdominal

Circular y calentar

Equipos de protección individual

Instrumentista
Cirujanos

Gestión de residuos citotóxicos

Alcanzar temperatura HIPEC: 42 - 43°C

Introducir quimioterapia: inicio HIPEC

**DOXORUBICINA
OXALIPLATINO
CISPLATINO
MITOMICINA C
PACLITAXEL**

- **Tiempo:**
 - 30 min
 - 60 min
 - 90 min
- **En dosis única**
- **En tres dosis:**
 - 50% al inicio
 - 25% a los 30 min
 - 25% a los 60 min

Manejo maquina HIPEC

TEMPERATURA: 42° - 43°
VELOCIDAD DE INFUSION: 1000 ml/min
SUCCION: 60 - 80

Belmont
Instrument Corporation

VELOC. = 1000 $\frac{\text{ml}}{\text{min}}$		Tbomba = 45.0°C	
VOL = 18.2 L		T1 41.5	T2 42.9
P = 123 mmHg		T3 43.3	T4 43.3
VELOC. ▲	1000 $\frac{\text{ml}}{\text{min}}$	DESEADO ▲	44.9C
VELOC. ▼	VELOC.	DESEADO ▼	44.9C
STOP			

Hyperthermia Pump

Aumento de la temperatura corporal

Medidas de enfriamiento

TEMPERATURA QUIROFANO: 19° - 20°

Compresas frías

Sueros fríos

Hiperglucemia / Hipotensión

Importante la relajación muscular

Insulina

Noradrenalina

Electrolitos

**CLORURO
DE CALCIO**

**SULFATO DE
MAGNESIO**

**CLORURO
DE POTASIO**

BICARBONATO

Final HIPEC

Temperatura homogénea durante todo el proceso

Aspirado y lavado cavidad abdominal

Final cirugía

Informe de seguridad quirúrgica (antes de salir del quirófano)

1.- ¿El recuento del material es correcto?		☒ SI ☐ NO ☐ NP
2.- ¿Está comprobado que las muestras biológicas están preparadas y etiquetadas?		☒ SI ☐ NO ☐ NP
3.- ¿Está preparado el material anestésico para el traslado?		☒ SI ☐ NO ☐ NP
4.- ¿Drenajes y sondas funcionan correctamente?		☒ SI ☐ NO ☐ NP
5.- ¿Ha precisado transfusión de hemoderivados?		☐ SI ☒ NO
6.- Incidencias		

Limpieza del Instrumental / Quirófano

- Llenar $\frac{3}{4}$ partes los cubos azules y cerrarlos
- Contenedores abiertos del instrumental
- Instrumental usado en el cierre de la cirugía sumergido en agua y detergente enzimático
- Reposo quirófano: 1 hora
- El instrumental sigue el circuito normal de esterilización
- Personal de limpieza y esterilización sin EPI
- Limpieza general del quirófano (paredes y techo)

Muchas gracias