



PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE ALOPECIA AREATA CON DIFENCIPRONA



Servicio de Dermatología del Hospital de Fuenlabrada. Madrid. Martín Freile, Cristina; Navarro Santos, Violeta; Nogueras Flores, Isabel; Benítez Rayego, Guadalupe; Díez Suarez, M^a Paz.

ALOPECIA AREATA

- Aparición brusca de placas solitarias o numerosas, ligeramente deprimidas con folículos conservados
- Afecta especialmente a región occipital y temporal
- Afectación psico-social del paciente
- Difícil tratamiento



TIPOS ALOPECIA

AREATA (AA)

- **AA en placas:** pérdida de pelo en cantidad variable



TIPOS ALOPECIA

AREATA (AA)

- **AA total:** pérdida de todo el pelo de cuero cabelludo



TIPOS ALOPECIA


AREATA (AA)

- **AA universal:** pérdida de pelo que afecta a todo el tegumento (cuerpo, cuero cabelludo, pestañas, cejas, vello axilar o púbico)



ETIOPATOGENIA

- Enfermedad autoinmune
- La evolución de la AA es impredecible.
- Pronóstico: el 50% de repoblación dentro del primer año sin tratamiento. Del 7-10% tienen una enfermedad muy severa.



TRATAMIENTO

Si afecta a < 50% del cuero cabelludo:

- Corticoides tópicos o inyectados localmente
- Minoxidil tópico
- Antralinas

Si afecta a > 50% del cuero cabelludo:


- Corticoides orales
- PUVA
- Aplicación de Difenciprona tópica

¿QUÉ ES LA DIFENCIPRONA?

- Es un potente sensibilizante sintetizado a partir de la dibencilacetona.
- Es un producto de aplicación tópica que prácticamente no se absorbe y que no presenta capacidad mutagénica in vivo.
- Mecanismo de acción: capacidad inmunoreguladora, da lugar a una disminución de la inflamación de origen autoinmunitario.

SENSIBILIZACIÓN CON DFC

- Antes de comenzar el tratamiento con DFC debe realizarse la sensibilización, que consiste en aplicar un parche con DFC 2% durante 48 h.



SENSIBILIZACIÓN CON DFC

- Pasados 14 días se procede a testar la DFC a diferentes concentraciones (0,01%, 0,001% y 0,0001%).
- Reacción local en la zona tratada (reacción inflamatoria eccematosa).



APLICACIÓN DE DIFENCIPRONA

- Una vez determinada cuál es la concentración que produce eccema, se procede a iniciar la aplicación de DFC a una concentración inferior a la que produce irritación
- Aplicación semanal durante las primeras 4 semanas



APLICACIÓN DE DIFENCIPRONA II

- Posterior aumento a 2 veces a la semana y revisión con dermatólogo cada 2 meses
- El personal de Enfermería debe protegerse con guantes para evitar sensibilización



DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

- La duración del tratamiento es variable. El crecimiento del cabello puede empezar a verse en 12 semanas.
- La DFC es una sustancia fotoinestable, evitar fotoexposición durante las 48 horas siguientes a la aplicación y proteger el recipiente del sol.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- Eritema
- Prurito
- Descamación leve
- Flictenas
- Aumento de ganglios linfáticos regionales
- Raramente síntomas pseudogripales



ERITEMA POST-
APLICACIÓN DFC



CONCLUSIONES

- El tratamiento con DFC es una alternativa terapéutica satisfactoria en pacientes con Alopecia areata. La utilización de DFC por vía tópica ha permitido en algunos pacientes una repoblación del cabello estéticamente aceptable.

